



**Геоморфологическая схема дна Каспийского моря (Леонтьев и др., 1977):**

Типы берегов: 1 – аккумулятивные; 2 – абразионные; 3 – абразионно-аккумулятивные. Зона шельфа: 4 – равнины прибрежной отмели; 5 – волнистые и наклонные шельфовые равнины; 6 – субгоризонтальные равнины днищ шельфовых впадин; 7 – наклонные равнины днищ шельфовых впадин; 8 – равнины хемогенно-терригенной аккумуляции отчлененных заливов. Зона материкового склона: 9 – наклонные равнины; 10 – валы («горные хребты»). Зона абиссальных равнин ложа Южнокаспийской котловины: 11 – субгоризонтальные плоские абиссальные равнины; 12 – наклонные плоские абиссальные равнины; 13 – холмистые абиссальные равнины. Формы и комплексы подводного рельефа: 14 – авандельты; 15 ветровые осушки; 16 – ступенчатый бенч; 17 – грядовый бенч; 18 – крупные подводные аккумулятивные формы (банки); 19 – бороздины; 20 – речные долины и другие эрозионные затопленные формы; 21 – подводные каньоны; 22 – комплекс подводно-оползневых форм; 23 – эрозионные формы, связанные с деятельностью суспензионных течений; грязевые вулканы.